

Das Fohlen verliert bei der Geburt seine Mutter

1. Stunde nach der Geburt:
Fohlen mit Stroh trocknen.
Optimale Körpertemperatur des Fohlens: 37,2 bis 38,9 Grad.

1 bis 3 Stunden nach der Geburt:
Colostrum verabreichen.
Das Fohlen steht zum ersten Mal.

Nach 8 Stunden:
Fohlen uriniert zum ersten Mal.
Tierarzt verständigen.

Nach 12 bis 24 Stunden:
Abgang Darmpech, erster, harter Stuhlgang des Fohlens.

Pavo SOS Kit

Pavo Colostrum

Aufzucht mit der Flasche

Pavo Podo®Lac

Aufzucht mit einer Ammenstute

Fohlenmilch mit einer Flasche füttern.

Pavo FoalMilk

Kot von einem gesunden Pferd zur Verfügung stellen.

Fohlen in eine Herde integrieren.

Futter & Wasser anbieten.

Pavo Podo®Start

Pavo Podo®Grow

Pavo Podo®Care

Ammenstute finden.

Ammenstute und Pflegefohlen zusammenbringen.

Absetzung individuell bestimmen: Ab dem 3. Monat möglich.

Pavo Podo®Start

Pavo Podo®Grow

Pavo Podo®Care

Kombination: Aufzucht mit einer Ammenstute und der Flasche

Pavo FoalMilk